



Communiqué de presse 03/06/2021
Services du Collège réuni - Commission communautaire commune

La situation épidémiologique en Région de Bruxelles-Capitale

Les indicateurs épidémiologiques bruxellois poursuivent leur baisse. Grâce à la situation dans les hôpitaux, surtout en soins intensifs, et à l'avancée de la vaccination, nous nous dirigeons vers un assouplissement des mesures sanitaires.

Indicateurs-clés

Le **taux d'incidence** (c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100.000 habitants) **diminue légèrement** : il est passé à 278 le 27/05, contre 274 le 03/06.

Le nombre de tests PCR et tests antigènes effectués à Bruxelles passe à près de 40.000 unités. Nous constatons également que le **taux de positivité** (soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués), **diminue**, puisqu'il est passé de 4,8% le 27/05 à 4,2% ce 03/06.

La **valeur R** (le nombre d'infections provoquées par une personne malade) passe **en-dessous de la barre de 1**, puisqu'elle est de 0,106 au 27/05, contre 0,87 le 03/06.

Contaminations

Le **variant britannique (Alpha)** diminue mais reste le variant le plus répandu en Belgique, avec un taux de 87,6% des contaminations. Le **variant brésilien (Gamma)** est le deuxième variant le plus répandu, avec un taux de 10,5%. Le **variant indien (Delta)** est à présent le troisième variant le plus répandu sur le territoire belge avec un taux de 1,3%; tandis que le **variant sud-africain (Beta)** présente un taux de 0,9%.

Pour ces variants, mis à part le variant britannique qui reste dominant, la procédure de tracing d'usage est renforcée pour contenir leur propagation au maximum. En outre, plusieurs laboratoires ont pu ajouter le séquençage du variant indien au test PCR classique. Ce qui permet d'en détecter plus rapidement les cas de contamination en passant de 2 à 3 jours, contre de 14 jours à 3 semaines auparavant.

Hospitalisations et décès

Les **hospitalisations diminuent** fortement, passant de 206 le 27/05 à 163 le 02/06. La courbe des hospitalisations suit la même évolution qu'au niveau national.

Le **nombre de personnes en unités de soins intensifs** dans les hôpitaux bruxellois est aussi en **diminution**, passant de 93 au 27/05 à 65 le 02/06.

Le **nombre de décès est plutôt stable** puisqu'il est passé de 16 décès le 27/05 à 18 ce 03/06.

Pour enrayer la propagation du virus et **avoir un virus sous contrôle**, il est essentiel de respecter les mesures de prévention liées au Covid-19 et les mesures en cas de symptômes ou de contagion :

- 1) respecter les mesures sanitaires et les gestes barrière (par exemple, en privilégiant les activités en extérieur),
- 2) se placer en quarantaine et se faire dépister dès l'apparition du moindre symptôme* et en cas de contacts à haut risque,
- 3) se faire vacciner.

La combinaison de ces trois éléments pourra nous donner une perspective d'un retour à la vie normale.

***Se placer en quarantaine et se faire tester dès l'apparition du moindre symptôme** (toux, difficultés respiratoires, fièvre, courbatures, fatigue, perte du goût et/ou de l'odorat, nez bouché, mal de gorge, ou encore diarrhée). Le dépistage est gratuit : [à Bruxelles, les personnes symptomatiques peuvent se présenter dans un centre de test sans prescription préalable d'un médecin](#) (la prescription pour le test se fait alors par le médecin dans le centre de test).

Plus d'informations sur le dispositif Covid-19 à Bruxelles sur coronavirus.brussels. Suivez aussi notre actualité sur notre [page Facebook](#).