



OMZENDBRIEF

Informatie betreffende het herhaalvaccin COVID-19 voor zorgpersoneel in ziekenhuizen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1. Achtergrond

De voornaamste objectieven van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 zijn het beschermen van risicogroepen en het bereiken van een groepsimmunitet bij de bevolking om zo de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden.

Het is dus heel belangrijk om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Als einddoel stellen we de terugkeer naar een normaal leven.

2. Huidige context.

De incidentie van COVID-19 infecties in de bevolking en het aantal gehospitaliseerde COVID-19 patiënten neemt opnieuw toe. De 4^e golf is een feit en wederom lopen kwetsbare personen meer kans op besmetting en staat de zorgsector opnieuw onder druk.

In deze context is het erg belangrijk om het zorgsysteem in stand te houden en de virusoverdracht binnen de zorgsector zo laag mogelijk te houden. Kwetsbare en hulpbehoevende personen moeten van veilige zorg kunnen blijven genieten en onze onmisbare zorgverleners die in contact komen met patiënten moeten in alle veiligheid hun functie kunnen blijven uitoefenen.

3. Waarom wordt een herhaalvaccin aangeboden aan zorgverleners?

Uit wetenschappelijk voortschrijdend inzicht is gebleken:

-dat bij kwetsbare personen de effectiviteit van vaccins afneemt naarmate de tijd verstrijkt. Wanneer men zich in een collectiviteit bevindt, kan een eventuele cluster deze personen in het bijzonder in het gevaar brengen.

-dat een extra dosis van een mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een betere bescherming. Deze extra dosis helpt het immuunsysteem te versterken en verhoogt zowel de individuele immuniteit als de groepsbescherming.

4. Welke zorgverleners komen in deze fase in aanmerking voor een herhaalvaccin?

De Interministeriële Conferentie (CIM) Volksgezondheid heeft op 30 oktober 2021 beslist om behoudens de kwetsbare groepen ook het personeel **dat in contact komen met patiënten** inclusief stagiairs en studenten ouder dan 18 jaar die werkzaam in ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen een booster- of herhaalvaccin aan te bieden

5. Welke vaccins worden gebruikt als herhaalvaccin?

Enkel mRNA vaccins zullen ingezet worden voor een herhaalprik. In België zullen voor de herhaalvaccins enkel de vaccins van Pfizer BioNTech (Comirnaty) en Moderna (Spikevax) worden gebruikt.

Voor personeelsleden van en zelfstandigen werkzaam in ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen die in contact komen met patiënten inclusief stagiairs en studenten ouder dan 18 jaar zal het vaccin van Pfizer of Moderna worden ingezet als herhaalvaccin.

Belangrijke opmerking: de instructies voor toediening van herhaalde doses Pfizer- en Moderna-vaccins zijn verschillend. **Het belangrijkste punt** is dat voor **het Moderna-vaccin een halve dosis als booster dosis (= 3e dosis) wordt gebruikt**; voor Pfizer wordt de volledige dosis als booster dosis gebruikt. Meer informatie zal u zo spoedig mogelijk per afzonderlijke brief worden toegezonden.

6. Hoeveel tijd moet er zijn tussen de laatste dosis verkregen van een eerder toegediend vaccin en de herhaaldosis van een mRNA vaccin?

Laatst verkregen vaccin (unidose of tweede dosis)	Te respecteren tijdsinterval vooraleer het herhaalvaccin toe te dienen
Johnson & Johnson (unidose)	4 maanden
Astra Zeneca	4 maanden
Pfizer	6 maanden
Moderna	6 maanden

7. Kan een herhaalvaccin van het Covid-19 vaccin toegediend worden samen met het klassieke griepvaccin?

Op basis van de aanbevelingen van gezondheidsexperts, specificeert de nationale Taskforce Covid-19 dat er geen minimuminterval in acht moet worden genomen tussen vaccinatie tegen Covid-19 en niet-levende vaccins. Uit wetenschappelijke oogpunt kunnen beide vaccins (Covid-19 + Influenza) simultaan worden toegediend. Bij voorkeur zal men het coronavaccin in de rechterarm toedienen en het griepvaccin in de linkerarm zodat eventuele nevenwerkingen gemakkelijk kunnen gecontroleerd worden.

8. Waar vindt de vaccinatie plaats voor zorgverleners in ziekenhuizen ?

Zorgverleners binnen deze collectiviteiten zullen gevaccineerd worden binnen de collectiviteit waarvan zij deel uitmaken en dit door de lokale equipes of door de arbeidsarts, en dit in overleg met de arbeidsgeneesheer.

9. Sart van de herhaalvaccinatie

Deze vaccinatiefase met herhaalvaccins kan van start gaan van zodra uw instelling er praktisch klaar voor is

De arbeidsgeneesheer verbonden aan uw instelling zal met u contact opnemen om deze vaccinatie te organiseren. Uiteraard kan u ook zelf contact opnemen met de verantwoordelijke arbeidsarts van uw collectiviteit met betrekking tot de voorbereiding van deze vaccinatieronde.

U kan alvast een actueel overzicht maken van het exacte aantal vaccins dat uw instelling nodig zal hebben voor deze vaccinatieronde. Hou hierbij ook rekening met eventuele aanwervingen van nieuwe personeelsleden die intussen zouden plaatsvinden.

De praktische informatie om deze vaccinatie voor te bereiden wordt a.s.a.p. nagestuurd aan u en de verantwoordelijke arbeidsarts. Mocht u na ontvangst van deze informatie nog vragen hebben, kan u ons contacteren via mail: vacci-hyg@ccc.brussels.

Wij danken u alvast opnieuw voor alle reeds geleverde inspanningen en uw bereidwillige medewerking m.b.t deze volgende fase van de vaccinatiecampagne.

Voor de Leidend Ambtenaar, afwezig,

Sophie Verhaegen
Directie Gezondheid en Bijstand aan Personen
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie